



République du Sénégal
Un Peuple—Un But—Une Foi

**Ministère de l'Agriculture de la
Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage**



Direction de la Protection des Végétaux

Division Avertissements Agricoles

BULLETIN PHYTOSANITAIRE HEBDOMADAIRE

DU 02 au 08 septembre 2024

Division Avertissements Agricoles	ENREGISTREMENT	Référence : N°011 /DAADPV/2024
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

SITUATION PHYTOSANITAIRE

La situation phytosanitaire de cette semaine est marquée par les infestations de la chenille légionnaire d'automne, de pucerons et de cantharides principalement dans les régions de Louga, Tambacounda, Kaolack, Kaffrine, et Thiès.

Ces infestations sont notées sur jachère, niébé, maïs, arachide et mil

Les traitements phytosanitaires se poursuivent avec le déploiement des Unités de Protection des Végétaux (UPV) au niveau des sites concernés. Ces dernières sont appuyées par les Comités de Lutte Villageois (CLV) équipés de pulvérisateurs manuels et d'atomiseurs.

Les Pucerons

Dans les départements de Tivaouane (Nianène, Gatty Gningue), de Kébémér (Fallène Sélé Diagne, Darou Parba, Kocci Diop, Diégnakh, Diokoul, Sagatta guett, Kanène Ndiob, Thiolom Fall, Loro, Darou Mousty, Mbacké Cadior, Touba Merina), de Mbour (Nginckho) et de Louga (Nguen Sarr, Sakal, Niomré, Mbédiène, Léona, Koki, Thiamène Cadior, Kelle Gueye) la présence de Pucerons au stade adultes a été signalée. Ces infestations ont été observées sur Jachère, champs d'arachide (floraison) et niébé (floraison). Sur une superficie d'environ 900 ha infestées, 670 ha ont été traités avec du Fénical 500 EC. Les traitements phytosanitaires se poursuivent au niveau des sites concernés.

La chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*)

Des signalisations de la CLA sur maïs ont été notées à Keur Ndiaye LO (département de Rufisque), à Ndawène, Ndiédieng (département de Kaolack), à Thiamène Walo (département de Nioro) et à Darou Salam 2 (département de Koumpentoum) sur une superficie totale d'environ 80 ha. Les traitements phytosanitaires se poursuivent au niveau des localités touchées.

Autres ravageurs

- La présence de Cantharides sur mil au stade adulte est notée dans le département de Nioro (Keur Massar Ba, Keur Samba Yacine). Les 155 ha infestés ont été traités avec du Fénical 400 EC
- Il a été noté également dans les départements de Birkelane (Touba Khadama, Ndiayéne Waly), de Kaffrine (Kahi, Kawsara, Ndiary, Diamagadio) et de Kounghoul (Ribot Kodioly) la présence de *Psalydolytta sp* et *Mylabris holosericea* sur champs de mil (épiaison, floraison). Du pesticide a été distribué aux paysans dont les champs sont infestés par ces coléoptères.
- 17 ha de cultures d'arachides ont été touchés par les larves de *Melolontha melolontha* qui attaquent les racines des plantes. Ces infestations sont observées à Ndrame dans le département de Nioro.
(Poursuite traitements phytosanitaires)



Larve de hanneton (*Melolontha melolontha*)

*CLA : chenille légionnaire d'automne

Recommandations

- ✚ Intensifier les prospections pour une alerte précoce ;
- ✚ Communiquer avec les producteurs sur leurs préoccupations ;