



République du Sénégal
Un Peuple—Un But—Une Foi

**Ministère de l'Agriculture de la
Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage**

Direction de la Protection des Végétaux

Division Avertissements Agricoles



BULLETIN PHYTOSANITAIRE HEBDOMADARE

DU 23 au 30 septembre 2024

Division Avertissements Agricoles	ENREGISTREMENT	Référence : N°15 /DAADPV/2024
--------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

SITUATION PHYTOSANITAIRE

La situation phytosanitaire de cette semaine est marquée par les infestations de la chenille légionnaire d'automne (CLA) sur maïs, de la chenille mineuse de l'épi de mil et de coléoptères méloïdés sur mil principalement dans les régions de Kaffrine, Thiès et Sédhiou.

Les traitements phytosanitaires se poursuivent avec le déploiement des Unités de Protection des Végétaux (UPV) au niveau des sites concernés. Ces dernières sont appuyées par les Comités de Lutte Villageois (CLV) équipés de pulvérisateurs manuels et d'atomiseurs.

La chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*)

Les prospections réalisées durant cette semaine ont révélé des infestations de la CLA au stade (L3 et L4) sur environ 120 ha occasionnant des défoliations sur maïs. Ces attaques sont notées à Thiénaba (département de Thiés), à Kandialon (département de Bounkiling), à Médina Tahirou, Medina Salam et Ribot Escalé (département de Kounghoul). Des traitements phytosanitaires ont été effectués avec du Fénical 500 EC au niveau des zones infestées.

Les insectes floricoles (*Psalydolytta* sp, *Mylabris holosericea* et *Heliocheilus albipunctella*)

Ces ravageurs d'inflorescences ont été observés à Fass Bamba (Kounghoul), à Keur Ngor thiaw Back, Back Mbadane (Département de Mbour), à Diass Palam, Ngolfagning (Thies), à Diokoul Kélimane, Kawsara, Keur Sa Ndao, Bountoume (Département de Kaffrine) et à Darou Barry (département de Kounghoul). Leurs densités varient en moyenne entre 8 et 10 individus par épi de mil et ont entraîné des dégâts sévères par endroit. Les UPV déployées ont effectuées des traitements phytosanitaires sur environ 380 ha infestés avec du Fénical 500 EC. La lutte se poursuit au niveau des localités touchées.



Figure 1. *Heliocheilus albipunctella* et dégâts occasionnés sur épis de mil

NB : Les pluies enregistrées durant cette semaine ont permis de réguler naturellement les nuisibles des cultures.

Recommandations

- ✚ Intensifier les prospections pour une alerte précoce ;
- ✚ Redynamiser les CLV ;